

2014年5月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう保管してください。

第②類医薬品

あかひげ オーロラ-S

女性ホルモン配合 軟膏剤
Aurora-S

製品の特徴

女性ホルモン（エストロゲン）減少あるいは、分泌不全による様々な症状は、女性ホルモンを補充することで、症状の緩和が期待できます。オーロラ-Sには、皮膚の柔軟部から体内に吸収される、エチニルエストラジオール（卵胞ホルモン）やオットセイ油を配合しています。

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ご使用前に本剤をチューブから5mm程出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人。
- (3) エストロゲン依存性腫瘍（乳ガン、子宮頸ガン、子宮体ガン）、子宮筋腫、子宮内膜症及びその疑いのある患者。

- (4) 未治療の子宮内膜増殖症のある患者。
- (5) 妊婦又は妊娠していると思われる女性。
- (6) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、口腔、鼻孔。
- (2) 湿疹、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

3. 本剤を使用している間は、卵胞ホルモンを含んだいづれの医薬品も使用しないこと

4. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けること

5. 本剤が他の人に付かないようにすること。また、付いた場合は直ちに洗い流すこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、水泡など）を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚 (塗った所)	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感
乳房	痛み、張り

3. 1ヵ月程度使用しても症状の改善が見られない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 誤った使い方をしてしまった場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

卵胞ホルモン分泌不全による不感症、冷感症、婦人更年期障害及び神経衰弱。

用法・用量

1回0.15～0.2g 1日数回、特に浴後・就寝前、指頭にて患部に塗布する。（15歳未満の小児は使用しないでください。）

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目にはいった場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 使用前後には、手指をよく洗うこと。

- (4) 塗布部を清潔にしてから使用すること。
- (5) 外用のみに使用すること。

成分・分量(1.0g中)

日局エチニルエストラジオール……0.5mg

添加剤として精製オットセイ油、ローズ油、エタノール、流動パラフィン、白色ワセリン、香料

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 本剤が出すぎた場合は、チューブに戻さないこと。

発売元
あかひげ薬局
名古屋市中央区椿町9番15号

製造販売元
株式会社 ヴィタリス製薬株式会社
埼玉県比企郡吉見町下細谷96
お問い合わせ: 0120-199301
受付時間 9:00～17:00まで（土・日・祝日を除く）